Epernay Pays de Champagne

Communauté de Communes

Agence de l'Eau Seine Normandie

Rêves de sauvagine

Frontières entre le milieu terrestre et le milieu aquatique, les zones humides, tel ce jardin, sont des réserves de biodiversité. Elles offrent les conditions de vie indispensables à de nombreuses espèces animales. La sauvagine (les oiseaux d'eau) trouve ainsi dans ces milieux à boire et à manger, de quoi nicher et se reproduire ou encore de quoi faire une halte au cours de ses voyages migratoires.



Héron cendré

(Ardea cinerea)

Fréquente le "Jardin Humide" toute l'année

Il se nourrit principalement d'animaux faibles ou malades. Il participe ainsi à la sélection naturelle des espèces et évite la dispersion des maladies.

C'est un échassier : on pourrait croire en effet qu'il marche sur des échasses ! Ses pattes, son cou et son bec sont longs et bien adaptés à la pêche dans les eaux peu profondes.

Présence

j	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d

Milieux humides sauvages ou cultivés (prairies, marais, bords de cours d'eau, champs). Niche en colonies (héronnières) dans de grands arbres.

Poissons, insectes, mollusques (escargots, limaces), batraciens (grenouilles, tritons), vers, petits mammifères.

Chevalier cul-blanc

(Tringa ochropus)

Fréquentent tous deux le "Jardin Humide" lors de haltes migratoires

Oiseau plutôt solitaire, discret et nerveux, il s'observe surtout à l'envol. Dérangé, il monte très vite en lançant des cris clairs "tuit tuit tuit" et laisse apercevoir son croupion blanc.

Présence

j	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d

En été, dans les forêts marécageuses ; en hiver et pendant la migration, dans les mares, fossés et sur les berges vaseuses des cours d'eau.

Insectes, araignées, crustacés, mollusques, vers.

Tarin des aulnes

(Carduelis spinus)

L'hiver, les tarins des aulnes se laissent observer en petites bandes. Pour descendre des pays du nord vers leurs sites d'hivernage, on dit qu'ils se déplaceraient d'aulne en aulne en suivant les cours d'eau !

Présence

j	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d

En été, dans des forêts de conifères ; en hiver, dans les jardins et les boisements d'aulnes, de bouleaux, en bord des étangs et cours d'eau.

Graines de conifères, d'aulnes, de bouleaux ; bourgeons, baies, chenilles, pucerons.

Phragmite des joncs

(Acrocephalus schoenobaenus)

Végétation variée et basse (roseaux, joncs, buissons) à proximité de l'eau (cours d'eau, marais, étangs).

Coupe profonde d'herbes et de tiges sèches accrochée dans la végétation basse.

Insectes aquatiques, libellules, chenilles.

Présence

j	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d

Fréquentent tous trois le "Jardin Humide" pendant la période de reproduction

Membre du groupe d'oiseaux qu'on nomme "fauvettes aquatiques", c'est le plus courant des phragmites. Il chante perché sur un roseau ou lors d'un court vol vertical dont il se laisse retomber en parachute.

Râle des genêts

(Crex crex)

Prairies humides, champs de céréales, luzerne.

Petit creux gratté dans le sol, tapissé d'herbes et de feuilles, caché dans la végétation.

Insectes et leurs larves, mollusques, vers de terre, graines et débris végétaux.

Présence

j	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d

Le râle des genêts est une espèce sérieusement menacée. L'assèchement des prairies humides modifie son habitat. La coupe précoce des cultures détruit ses nichées. Faucher plus tard dans la saison ou laisser des bandes de végétation qu'on viendra faucher ensuite sont des pratiques agricoles qui lui sont plus favorables.

Loriot d'Europe

(Oriolus oriolus)

Boisements (frênes, aulnes, peupliers) des bords de cours d'eau, bosquets, parcs, allées d'arbres.

Hamac suspendu dans un arbre à 15 ou 20 m de haut.

Insectes et leurs larves, araignées, mollusques, fruits (cerises).

Présence

j	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d

C'est un oiseau discret qui se fond dans le feuillage des grands arbres. Difficile à observer, il se fait par contre bien entendre dès son retour de migration en avril mai. Son chant ressemble à un sifflement de dragueur !

Rédaction et cartes : Juliette Chorlis-Nyst
créations et images : 06 03 29 39 52 62